

# KadeFungin® Milchsäurekur

**Mit (S)-Milchsäure und pH 4**

**-> Regeneriert und stabilisiert die saure Vaginalflora:**

**Bei physiologischem pH-Wert wachsen die schützenden Laktobazillen und die natürliche Balance der Scheidenflora wird wiederhergestellt**

- Zur Nachbehandlung von Vaginalmykosen
- Zur unterstützenden Behandlung von bakteriellen Vaginosen
- Ideal zur pH-Wert-Regulierung während der Schwangerschaft (Frühgeburt prophylaxe)
- Für jede Frau allgemein zur Verringerung der lokalen Infektanfälligkeit und zur Verbesserung der Abwehr im Intimbereich

**UVP: 14,55 € für 7 Einmal-Applikatoren**



# KadeFungin® Milchsäurekur

<b>Status:</b>	Medizinprodukt
<b>Hersteller:</b>	Dr. Kade GmbH
<b>Wirksubstanz:</b>	S-Milchsäure zur Senkung des pH-Wertes in den natürlich sauren Bereich
<b>pH-Wert:</b>	4
<b>Anwendungsgebiet:</b>	Zur Nachbehandlung und Prävention von vaginalen Pilzkrankungen und bakteriellen Infektionen
<b>Therapieziel:</b>	Wiederherstellung der Vaginalflora, Stabilisierung des vaginalen Milieus und Feuchtigkeitsgabe
<b>Darreichungsform:</b>	Vaginalgel (leicht entnehmbar)
<b>Zusammensetzung:</b>	1 Applikator enthält 2,5 g entnehmbares Milchsäuregel
<b>Packungsgröße:</b>	7 hygienisch verpackte Einmal-Applikatoren – auch für unterwegs
<b>Dosierung:</b>	1x täglich für 7 Tage, nach Therapieschema
<b>Anwendung:</b>	abends in die Scheide einführen
<b>Nebenwirkungen:</b>	zu Beginn der Therapie leichtes Brennen möglich
<b>Besonderheiten:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keine Kühlung</li><li>- Frei von Konservierungs-, Duft-, Farbstoffen &amp; allergenen Zusätzen</li><li>- Geprüfte Sicherheit in der Anwendung mit Kondomen</li><li>- Gynäkologisch und dermatologisch mit „sehr gut“ getestet</li></ul>



# KadeFungin® Milchsäurekur

## Therapieschema für die Anwendung der KadeFungin® Milchsäurekur:

### Aufbau der Vaginalflora nach Infektionen

- Linderung von Begleitsymptomen der bakteriellen Vaginose wie unangenehmer Geruch, anormaler Ausfluss und leichte Schmerzen
- Regeneration nach Vaginalmykosen

### Stabilisierung der natürlichen Vaginalflora und Vorbeugung

Nach Antibiose	.....> nach antibiotischer Therapie 1 Kurpackung KadeFungin® Milchsäurekur
In der Schwangerschaft	.....> ab der ersten Schwangerschaftswoche bis zur Entbindung 1 Applikator KadeFungin® Milchsäurekur / Woche bei Bedarf* <small>* insbesondere im Fall eines wenig sauren Scheidenmilieus</small>
Erhaltung der natürlichen Balance bei Neigung zu bakteriellen Vaginosen und rezidivierenden Vaginalmykosen	.....> nach der Menstruation 2 – 3 Tage je 1 Applikator KadeFungin® Milchsäurekur

